


«ВІЛ/СНІД.

Ти повинен це знати!»



1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом




**СНІД – синдром
набутого
імунодефіциту**

СНІД


ВІЛ

**ВІЛ – вірус
імунодефіциту
людини**



На сьогодні не існує вакцини для профілактики СНІДу і недостатньо ефективні методи лікарської терапії цього захворювання

Основна проблема створення лікарських препаратів проти СНІДу полягає у високій властивлості ВІЛ змінювати свою структуру



A pair of hands, one above and one below, are shown in a dark, almost black background. The hands are rendered in a light, almost white color, with a soft glow. Between the hands, a glowing, spherical virus particle is visible. The virus has a greenish-blue core and is covered in numerous small, brown, spiky protrusions, resembling a coronavirus or a similar enveloped virus. The overall composition is centered and symmetrical, with the hands framing the virus.

Середня тривалість життя ВІЛ-інфікованої людини становить приблизно 12 років, однак сучасні препарати збільшують цю цифру в 2-3 рази.

Сучасні препарати для лікування СНІДу діють всередині клітини, не дозволяючи ВІЛ розмножуватись.



ПЕРЕДАЄТЬСЯ...

Статевим шляхом

Під час вагітності

Через орально-вагінальний контакт

З материнським молоком

При створенні татувань
Через укуси тискання
і пірсингу



Через спільне
використання
одноразового шприца

Повітряно
При потраданні в
Через порожнину шляхом
кров (донорське
вливання)

男人不戴，女人受

МАТИ І ДИТИНА

За даними
Всесвітньої
організації
охорони
здоров'я,
ризик
передачі ВІЛ-
інфекції від
матері дитині
становить
20–45%.

При проведенні
відповідного лікування цей
ризик можна знизити до 1-
2%.



СТАТЕВІ СТОСУНКИ

За останні два роки число людей, які заразилися ВІЛ статевим шляхом, збільшилось майже в два рази.



На сьогоднішній день 45% заражень відбувається через незахищені статеві контакти

НАРКОМАНІЯ

Від загальної кількості ВІЛ-інфікованих,
наркомани складають 88%

В Україні 450 тисяч молодих
людей з подвійним діагнозом
– ВІЛ - наркоманія...

52% заражень ВІЛ
відбувається «через шприц»...






**Отже, є 3 шляхи
зараження ВІЛ/СНІД:**



1.

Через кров
(при
використанні
нестерильних
шприців, при
переливанні
крові)



2.

**При статевих
контактах з
ВІЛ-
інфікованою
людиною**



3.

**Від ВІЛ-
інфікованої
матері до
дитини (під
час вагітності,
пологів,
кормління)**



ОЗНАКИ СНІДУ

- ✓ втрачає вагу;
- ✓ людина відчуває постійну втому;
- ✓ довго може триматися висока температура;
- ✓ підвищена пітливість;
- ✓ частий пронос;
- ✓ спостерігаються сухий кашель і задишка;
- ✓ легкі інфекції, наприклад, простуда протікають набагато серйозніше і тривають значно довше звичайного;
- ✓ у хворих СНІДом можуть початися пневмонія, коліт, герпес, грибкова інфекція в порожнині рота, горлі, стравоході і прямій кишці;
- ✓ хворі СНІДом більш уразливі відносно раку.



Статистика...

Сьогодні число ВІЛ-інфікованих у світі перевищує 30 млн., а померло від цієї хвороби — 6 млн. людей.



Щоденно ВІЛ заражається більше 6 000 людей, що дає змогу говорити про пандемію СНІДу.



Україна за темпами розвитку епідемії ВІЛ-інфекції займає

2-е місце в Європі і 5-е — у світі.




Україна за
темпами росту
захворювання
наздоганяє
навіть Африку

При сьогоднішніх
темпах розвитку
захворювання в
2014 році від СНІДу
в Україні щоденно
буде померати 140
людей.


За 2007 рік у нас зареєровано 9000 нових випадків інфікування ВІЛ.

Це майже на 1,5 тисячі більше, ніж в минулому

Всесвітні акції



Благодійні концерти





Прикраси



novate.ru

Соціальна реклама

Eyes were distributed to on-lookers simultaneously





Виставки-презентації

Пам'ятай!
Небезпека поряд!
Твоє життя залежить від твоїх
обдуманих дій!





Не дай

СНІДУ

шанс!